

חיסונים

על כל גור כלבים יש לעבור מס' חיסונים בתחילת דרכו כגור וכן מס' חיסונים וטיפולים מונעים קבועים למשך כל ימי חייו כבוגר .
ואלה הם החיסונים :

א. חיסונים לגורים

הטיפול הראשון בגור שלנו במידה וקיבלנו אותו לפני גיל 6 שבועות הוא מתן סירופ נגד תולעי מעיים בגיל 5 שבועות זהו עדיין לא חיסון אלא טיפול מונע .
בגיל 8 שבועות יש לחסן את הגור שלנו בפעם הראשונה , לפני שמתחילים את החיסונים אני ממליץ לבחור וטרינר שיטפל בכלביכם באופן קבוע .
מחיר החיסונים משתנה כאשר כל וטרינר נוהג לגבות סכום אחר אך לא בהפרשים עצומים . יש לשאול את הווטרינר על עסקת גורים שמוזילה את המחיר של החיסונים לגור באופן משמעותי ביותר .
החיסון הראשון יהיה חיסון פרוו וכלבלבת + טיפול נגד תולעים .
אחרי שלושה שבועות בגיל 11 שבועות ניתן את החיסון השני שנקרא משושה זה יהיה חיסון ראשון מתוך 3 או 4 חיסוני משושה + תילוע בכל פעם (מס' החיסונים משתנה בין וטרינר לווטרינר) .
אחרי חיסון המשושה האחרון בגיל 20 שבועות ולא יאוחר ממועד זה יינתן חיסון הכלבת + שבב . חיסון הכלבת נועד למנוע את מחלת הכלבת ולהגן עלינו במקרים של נשיכה , השבב הוא מעין קפסולה זעירה שמוחדרת לכלב שלנו בצידו השמאלי של הגוף מקדימה (כתף שמאל) , השבב הוא בעצם תעודת הזהות של הכלב , מעין ברקוד כמו שיש על המוצרים בסופר ונועד על מנת לזהות את הכלב ולשייך אותו לבעליו במקרה של אובדן או גניבה .
גם כאן ניתן לחסוך הרבה כסף, לפני שפונים לווטרינר לביצוע החיסון אני ממליץ לפנות לשירותים הוטרינריים ברשות המקומית בה אתם מתגוררים , העלות של החיסון תהיה זולה בכ- 50% מהמחיר ששלם אצל הווטרינר .
מיד לאחר חיסון הכלבת צריך לעשות אצל הווטרינר טיפול מונע כנגד חיפושית הזבל ותולעת הפארק .

1 בית גידול לכלבי האסקי סיבירי, אילוף כלבים וחינוך גורים, ייעוץ לבעלי כלבים, מכירת מזון וציוד נלווה



תולעת הפארק - מה זה בכלל?

קודם כל חשוב להבהיר, תולעת הפארק אינה קשורה לתולעי המעיים שאותן ניתן לראות לפעמים בצואת הכלב. בניגוד לתולעי המעיים, תולעת הפארק גורמת למחלה קשה ולמוות.

תולעת הפארק, או בשמה האמיתי – ספירוצרקה לופי – היא תולעת קטלנית לכלבים. התולעת חודרת לגוף הכלב ומתיישבת בוושט, באבי העורקים ובעמוד השדרה. היא גורמת לפגיעה באברים אלו ולבסוף למוות. התולעים מטילות ביצים בגוף הכלב. הביצים, שהן מיקרוסקופיות בגדלן, יוצאות בצואת הכלב ונאכלות ע"י חיפושיות זבל שנאכלות בתורן ע"י כלבים אחרים וכך המחלה מתפשטת. לכן גם רצוי ומאד מומלץ לאסוף את הצואה של הכלב שלנו הן ברחוב והן בדשא.

כיצד אוכל לשמור על כלבי מפני המחלה?

יש להקפיד להביא את הכלב לוותרניר לזריקות למניעת תולעת הפארק. הזריקות ניתנות כל כמה חודשים – תלוי באזור המגורים שלכם. לצערנו נתקלנו גם בכלבי בית מובהקים שלא אוכלים תדיר זבל בחוץ שנדבקו במחלה!!! לכן – יותר פשוט למנוע! ישנם אזורים בארץ בהם לא נהוג לחסן כלל כנגד תולעת הפארק כגון אילת וירושלים. ברחובות והסביבה המינן המומלץ הוא פעמיים בשנה. באזור ראשל"צ, רמת גן ותל אביב, שם הנגיעות רבה יותר – מומלץ לקבל זריקה לפחות כל 3 חודשים לפי המלצת הווטרניר. הזריקות ניתנות הן למניעה והן כטיפול לאחר הדבקה.

חיסונים לכלב בוגר

כלבים בוגרים צריכים לעבור 2 חיסונים קבועים כל שנה, החיסון הראשון הוא חיסון המשושה והחיסון השני הוא חיסון הכלבת. מלבד החיסונים הקבועים ישנם שני טיפולים מונעים אותם חייב כלבנו לעבור: הראשון הוא תולעת הפארק חיסון זה צריך להתבצע כל שלושה חודשים והטיפול השני הוא כדורים נגד תולעים (דרונטל) שצריך להתבצע כל חצי שנה.

יש להקפיד על ביצוע כל החיסונים והטיפולים המונעים בזמן, במידה והווטרניר אצלו כלבכם מטופל אינו שולח תזכורות בדואר בנוגע לחיסונים יש לזכור ולרשום זאת ביומן

2 בית גידול לכלבי האסקי סיבירי, אילוף כלבים וחינוך גורים, ייעוץ לבעלי כלבים, מכירת מזון וציוד גלווה

3 בית גידול לכלבי האסקי סיבירי, אילוף כלבים וחינוך גורים, ייעוץ לבעלי כלבים, מכירת מזון וציוד נלווה